





**Racumin<sup>®</sup>**  
**FOAM** 

*Voor een snelle en efficiënte  
knaagdierbestrijding*



**Voordelen**

- // Toegelaten tegen ratten en muizen.
- // Wordt opgenomen bij reiniging van de vacht.
- // Aanbod plaatselijk voedsel speelt geen rol.
- // Toepasbaar op moeilijk te bereiken plaatsen.



## GEbruik

Het product moet toegepast worden op overdekte locaties waar knaagdieren geregeld komen: rondom holingangen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden, schachten, dwarsbalken, ... Om knaagdieren toe te laten hun toegangspunten (b.v. holingangen) te blijven gebruiken, is het belangrijk dat deze niet volledig afgesloten worden door het schuim. De toegang moet nog duidelijk zichtbaar blijven. Racumin® Foam wordt in eerste instantie gebruikt als een ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas. In omstandigheden waar andere middelen minder geschikt zijn (b.v. bij hoge luchtvochtigheid, in aanwezigheid van andere aantrekkelijke voedingsbronnen of voor de bestrijding van knaagdieren die geen lokaas eten), zorgt dit product voor een uiterst succesvolle knaagdiercontrole.

## WERKING

Racumin® Foam is een innovatief rodenticide voor gebruik tegen ratten en muizen. De unieke schuimformulering zorgt er voor dat het product aan de vacht kleeft. Hierdoor wordt het door het knaagdier opgenomen wanneer het zijn vacht reinigt.

## TOEPASSINGSGBIED

Uitsluitend voor gebruik binnen gebouwen.

## WERKINGSSPECTRUM

Racumin® Foam is een product op basis van de actieve stof coumatetralyl: een anticoagulerend middel dat de bloedstolling vermindert en inwendige bloedingen veroorzaakt. Wanneer de knaagdieren in contact komen met het product, blijft dit aan hun vacht kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken waardoor ze de actieve stof opnemen. Dit product bevat bovendien ook Bitrex®, wat zorgt voor een vermindering van het risico op toevallige inname door niet geviseerde dieren, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.

## DOSERING

Dosering	
Muizen	4 g - 30 g schuim / holingang of doorgang
Ratten	20 g - 30 g schuim / holingang of doorgang

## VERPAKKING

500 ml spuitbus.



GEbruik BIOCIDEN VEILIG  
LEES VOOR GEbruik HET ETIKET EN DE GEbruikSAANWIJZING  
**Samenstelling:** 0,406228 % coumatetralyl (CAS 5836-29-3).  
**Formulering:** aerosol spuitbus (AE).  
**Toelatingsnummer:** BE2014-0020.  
2019\_04



Download MSDS en etiket informatie op  
[www.environmentalscience.bayer.be](http://www.environmentalscience.bayer.be)